

MORT CAUSÉE PAR LES SOURIS : LES CAS D'HANTAVIRUS DEMEURENT RARES MAIS AUGMENTENT, PRÉVIENNENT LES CHERCHEURS

ABELL GESTION PARASITAIRE

Un article récent du National Post faisait la part belle à l'hantavirus. Plus précisément, aux souris sylvestres et à l'explosion de leur population dans les provinces des prairies cette année.

Cette pseudo-mignonne aura causé la contraction de la maladie chez 30 personnes en Saskatchewan et la mort de 10 cette année seulement, principalement suite au nettoyage d'abris, de cabanes ou de vides sanitaires, etc.

En tant que prestataires dans la santé publique, Abell Gestion Parasitaire peut aider le public à contrôler ces parasites et à enrayer la propagation du virus.

Il est important de communiquer le bon message et de nous assurer de nous protéger lors de situations impliquant les souris sylvestres.

L'hantavirus est un organisme transporté par les souris sylvestres. Une souris sylvestre porteuse transmettra le virus via ses excréments, son urine et sa salive. La souris habite normalement dans les zones rurales et semi-rurales dans des nids sous les arbres, dans les buissons ou dans des creux, les vides des bâtiments, ou les meubles inutilisés.

Les symptômes cliniques se déclenchent 1 à 5 semaines après l'exposition, et incluent :

- Fièvre
- Fatigue
- Douleurs musculaires
- Maux de tête
- Étourdissements
- Nausée
- Vomissements
- Frissons

Voici les étapes pour diminuer les risques de contracter le virus pour les professionnels en gestion parasitaire et le grand public.

- 1) Un contrôle efficace des rongeurs aux alentours du bâtiment est essentiel.
- 2) Portez des gants en nitrile et un masque respiratoire doté d'un filtre HEPA lors des interventions en zone infestée ou soupçonnée d'être infestée par les souris sylvestres comme les sous-sols, les vides sanitaires, les cabanons, les cabanes (etc.) et quand vous manipulez des pièges et retirez des souris mortes.
- 3) Désinfectez les zones où vous trouvez des rongeurs ou leurs excréments. Parfois les nids sont découverts à l'intérieur de meubles, il faut les tremper de désinfectant général, de Viracide ou d'eau de javel (3 cuillères à table par gallon d'eau) pour désactiver le virus.
- 4) Passez la serpillière dans la zone plutôt que de balayer ou de passer l'aspirateur.
- 5) Dans les zones à haut risque comme les sous-sols, les garages ou les endroits rarement fréquentés, portez toujours des gants et un masque respirateur doté d'un filtre HEPA lors du nettoyage. Assurez-vous d'avoir du désinfectant à portée de main.
- 6) Appliquez toujours du désinfectant aux rongeurs et aux pièges, et placez-les dans des sacs plastiques scellés avant de les jeter dans des poubelles hermétiques.

Pour résumer, l'hantavirus est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle transportée par les souris sylvestres. Il convient d'obtenir des soins médicaux si les symptômes se déclarent dans les 45 jours suivant une exposition potentielle.

En tant que fournisseur de services d'Abell Gestion Parasitaire, vous avez un rôle essentiel à jouer dans la prévention car nous offrons les connaissances et l'expertise nécessaires pour assurer la sécurité de nos clients.

